

## Betterave

### Maladies

Dans l'Aube et la Marne, les premiers symptômes de **cercosporiose** sont désormais clairement identifiés par nos analyses de laboratoire. Les autres maladies restent absentes de notre réseau d'observations.

■ **Nos conseils : surveillez et traitez dès l'apparition des premiers symptômes de maladies. Choisissez vos produits en fonction du complexe parasitaire en vous aidant du tableau au verso.**

### Ravageurs

Les morsures de **noctuelles** sont rares. La situation puceron reste inchangée.

■ **Nos conseils : ne traitez pas.**

## Maïs

Stade : floraison à début dessèchement des soies.

### Pucerons

A notre tour de Lavannes, les captures continuent de chuter, en particuliers celles de *M. dirhodum* et de *S. avenae*. *R. padi* reste l'espèce prédominante. Dans les parcelles, les populations diminuent et la faune auxiliaire est bien installée. Après analyses par l'AGPM, l'INRA et nos propres laboratoires (LNPV Le Rheu), les symptômes sur feuilles (déchirures, stries jaunes,...) et le nanisme des pieds sont dus à la présence des pucerons, *M. dirhodum*, et aux conditions climatiques difficiles de juin à début-juillet. L'ensemble du nord de la France est touché.

■ **Nos conseils : un aphicide est rarement justifié. Surveillez les pullulations après traitement anti-pyrale.**

## Pyrale

Les captures sont faibles ou nulles. Aucune ponte nouvelle n'est observée. Les premières perforations des larves dans les tiges sont détectées dans l'Aube (Saint-Pouange) et la Marne (Marais de Saint Gond).

## Tournesol

Stade : fin floraison.

### Maladies

Le feuillage est sain dans l'ensemble. Des symptômes de **phoma sur tige** sont visibles : taches brunes avec petits points noirs (pynides) en cercles.

■ **Nos conseils : ne traitez pas.**

## Luzerne

### Sitones

Les adultes sont prédominants dans les parcelles. Leurs morsures sont visibles sans causer encore de défoliations.

■ **Nos conseils : les jeunes semis non traités au PROMET CS doivent faire l'objet d'une surveillance très régulière en cette période de fauche des pois. En absence de traitement de semence, un insecticide peut s'avérer nécessaire et suffisant en bordure de parcelle si les populations d'insectes sont élevées. L'application est à renouveler après recolonisation des bordures.**

### Noctuelles

L'activité est faible.

■ **Nos conseils : surveillez vos parcelles.**

### Apions

Ils sont très rares.

■ **Nos conseils : surveillez les semis.**

Captures au filet fauchoir le 28 juillet.

| Lieu              | Taille | Nbe sitones | Nbe noctuelles | Nbe apions |
|-------------------|--------|-------------|----------------|------------|
|                   |        | Adultes     | Larves         | Adultes    |
| 08-Asfeld         | 90 cm  | 275         | 0              | 0          |
| Mont Laurent      | 30 cm  | 44          | 0              | 0          |
| 51-Cernon         | 65 cm  | 83          | 2              | 0          |
| Sompuis           | 70 cm  | 88          | 1              | 0          |
| Lavannes          | 80 cm  | 96          | 0              | 0          |
| Le Fresne         | 70 cm  | 16          | 0              | 0          |
| La Cheppe         | 70 cm  | 164         | 0              | 0          |
| Epoyes            | 80 cm  | 94          | 2              | 0          |
| Les Petites Loges | 70 cm  | 277         | 1              | 2          |
| Seuil             | 20 cm  | 11          | 0              | 2          |

TARIF COURRIER 380 F - FAX 430 F - PAGE 1

40 Jo  
43153

D3



Bonne continuation pour la moisson !



**Traitez dès l'apparition des premiers symptômes de maladies sur betterave.**

**Surveillez les sitones sur luzerne.**

P85

## Maladies foliaires de la betterave : les produits de traitements.

| Matières actives                | Spécialités commerciales | Dose ha                            | Cercosporiose                | Oïdium | Ramulariose | Rouille |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|---------|
| cyproconazole                   | ALTO                     | 0,6 L                              | O                            | O      | O           | O       |
|                                 | PAINDOR                  | 0,25 L                             | O                            | O      | O           | O       |
|                                 | SOLIMA                   | 0,25 L                             | O                            | O      | O           | O       |
| tétraconazole                   | DOMARK                   | 1 L                                | O                            | O      | O           | O       |
|                                 | MOGRAN                   | 0,8 L                              | O                            | O      | O           | O       |
|                                 | MOGRAN S                 | 7,5 KG                             | N                            | O      | N           | N       |
|                                 | TIMBAL                   | 1 L                                | O                            | O      | O           | O       |
| flusilazol                      | nombreuses               | 0,5 L                              | ++                           | +++    | ++          | ++      |
| fentine hydroxyde + flutriafol  | ANTARES                  | 1 L                                | ++                           | +++    | +++         | +++     |
| difenoconazole                  | GEYSER                   | 0,5 L                              | ++                           | +++    | +++         | +++     |
| difenoconazole + propiconazole  | ARMURE                   | 0,6 L                              | ++                           | +++    | +++         | O       |
| carbendazime + flusilazol       | ELKY, PUNCH              | 0,5 L                              | ++                           | +++    | +++         | +++     |
| carbendazime + flutriafol       | IMPACT, YELLOW           | 0,8 à 1 L                          | ++                           | +++    | +++         | +++     |
| fentine hydroxyde + triadimenol | PENNSUC                  | 1 L                                | ++                           | +++    | +++         | ++      |
| difenoconazole + fenpropidine   | SPYRALE                  | 1 L                                | O                            | O      | O           | O       |
| cyproconazole + fentine acetate | ALTO BS PEPITE           | 2 KG                               | ++                           | +++    | +++         | +++     |
| biteranol                       | BAYCOR 300 EC            | 0,8 L                              | ++                           | ++     | ++          | +++     |
| carbendazime + manèbe + soufre  | BLEDOR 3, VOLNEBE        | 8                                  | O                            | ++     | N           | N       |
| fentine acetate + manèbe        | BRESTAN 10               | 2,5 KG                             | O                            | N      | O           | N       |
| manèbe + thiophanate méthyl     | PELTAR                   | 2 KG                               | ++                           | N      | N           | N       |
| fentine hydroxyde + soufre      | TOPSUC                   | 7 L                                | ++                           | ++(+)  | ++(+)       | N       |
| fenpropimorphe                  | CORBEL BASF              | 1 L                                | N                            | +++    | N           | N       |
| fenarimol                       | RUBIGAN                  | 1 L                                | N                            | ++     | N           | N       |
| bénomyl                         | BENLATE, BENLATE 50 DF   | 0,3 KG                             | ++                           | N      | N           | N       |
| carbendazime                    | nombreuses               | 0,3 KG                             | ++                           | N      | N           | N       |
| mancozèbe                       | nombreuses               | 3200 G M.A.                        | ++                           | N      | ++          | N       |
| soufre                          | nombreuses               | 6 KG                               | N                            | +++    | N           | ++      |
| O = Homologué                   | N = non autorisé         | +++ = très bonne efficacité (>80%) | ++ = bonne efficacité (<80%) |        |             |         |

Liste arrêtée à avril 1997